

Bekämpfungsstrategien nach Befall am Baum Stammholz

Bohrmehl/Rammelkammer/Muttergang:

- Holzabfuhr
- Entrindung notwendig und wirksam
- **max. 4 – 6 Wochen Zeit bis Ausflug**



weißes Stadium:

- Holzabfuhr
- manuelle/maschinelle Entrindung notwendig und wirksam
- **max. 2 – 4 Wochen Zeit bis Ausflug**



Jungkäfer vor Reifungsfraß:

- Holzabfuhr
- Maschinelle Entrindung noch möglich (Käfer verlässt Rindenhäuten nicht – Abtötung durch Hitze der Gärprozesse und Nahrungsentzug)
- manuelle Entrindung bereits kritisch (überlebt i.d.R. nicht)
 - Verbrennen der Rinde am sichersten
- **max. 1 (– 2) Wochen Zeit bis Ausflug**



Bekämpfungsstrategien nach Befall am Baum



Hellbraune Jungkäfer nach Reifungsfraß/Altkäfer: Käfer ist ausflugbereit



- sofortige Abfuhr in Rinde
- maschinelle Entrindung kaum wirksam – Erhitzen des Rindenhaufens und mechanische Tötung nicht ausreichend
- manuelle Entrindung zu spät, Käfer überlebt – Verbrennen der Rinde notwendig
- sofortiger Abtransport der Stämme in Rinde mind. 500 m entfernt von nächstem Fichtenbestand
- sofortiger Insektizideinsatz

„Verzettelte Bruten“ – alle Entwicklungsstadien nebeneinander

- ist zu behandeln wie fertige Jungkäfer und Altkäfer
- Käfer ist am Ausflug zu hindern
- Vermeidung von Folgegenerationen und Geschwisterbruten